

# HELSE

## **Flått smitter hver femte hund**

(Artikkelen er hentet fra Dyrenett.no)

Tidligere beiteområder og dyrket mark langs kysten gror igjen. I buskaset stortrives flåtten, og hunder er mer utsatt for farlig smitte enn noensinne. Vi har tatt blodprøver av hunder på Sørlandet og funnet at rundt hver femte hund bærer smittestoffer fra flått i seg. Vi har ikke undersøkt hvor mange hunder som blir syke av smitten, men vi vet fra andre land at dyr kan dø av dette, sier veterinær og spesialist i smådyrsykdommer Ellef Blakstad.

Blakstad mener det er en klar sammenheng med nedbyggingen av landbruket og økte problemer med flått. 3000 gårdsbruk forsvinner hvert år, ifølge Norsk senter for bygdeforskning.

– Flåtten liker seg i lyng og busker som vokser opp når jord ikke drives lenger, og dyr er svært utsatt. De beveger seg midt i flåttens områder, sier han.

### **Lang inkubasjonstid**

Problemet er ofte at hunder som får flåttbitt om sommeren ikke blir syke med én gang. Smittes de av borrelia eller anaplasma, kan det gå flere måneder før de får feber og betennelse i leddene.

– Det er mange hundeeiere som ikke tenker på flåttbitt hvis hunden blir syk når snøen ligger på bakken. For å få avklart dette og sette i gang behandling, må veterinær undersøke hunden og ta blodprøve, sier Blakstad.

### **Smitteoverføring**

( Fra Nøtterøy dyreklinikk)

Å bli bitt av flått er i seg selv ikke farlig. Men det man frykter er mikroorganismer som flåtten overfører og som kan forårsake en rekke alvorlige sykdommer. Som regel vil et menneske merke om en flått har slått seg ned på kroppen og deretter fjerne snylteren. Verre er det for vår firbente følgesvenn. Den har liten eller ingen mulighet til selv å bli kvitt en flått som har bitt seg fast.

Den hyppigst forekommende flåttoverførte sykdommen hos hund er borreliose. Symptomene på borreliose kan være feber, tretthet, lammelser i ansiktet, epilepsianfall, muskelsmerter, halthet og ustø gange. En annen bakterie gir sykdommen ehrlichiose, med noen av de samme symptomene som boreliose. Flåttbitt kan også overføre virus som kan føre til alvorlige sykdommer som hjernehinnebetennelse hos både mennesker og dyr, omtalt som det nye flåttviruset TBE (tick-borne encephalitis). En ny undersøkelse viser at 16,4 prosent av 317 hunder i Aust-Agder har vært smittet av TBE. Man skal være klar over at flåtten kan bytte vert, dvs. at en flått som din

hund får med seg hjem kan krype over på deg eller andre i familien, suge blod og overføre smitte.

### **Kom problemet i forkjøpet**

Flåttbårne sykdommer er noe vi må leve med. Som hundeeier kan man med noen enkle grep unngå at hunden får flått. Det er viktig å regelmessig sjekke sin hund for flått. Finner du flått skal den straks fjernes: Fjernes flåtten innen 24 timer etter at den har bitt seg fast vil som regel smitteoverføring unngås.

Det finnes også effektive mottiltak. Et av tiltakene er flåtthalsbåndet Scalibor, spesielt egnet for hunder som bor i områder med mye flått. Det er effektivt 5-6 måneder og dekker dermed praktisk talt hele flåttsesongen. Scaliborhalsbåndet har også vist seg effektivt mot den plagsomme Tuneflua på østlandet og mot mygg på Finnmarksvidda. Scalibor tåler at hunden bader og blir våt, uten å miste effekt. For hunder som skal bevege seg i flåttområder kun i en kort periode bruker man som regel Bayvantic eller Exspot. Dette er dråper som påføres huden i nakkeregionen (evt. i tillegg ved halerota). Disse er effektive i ca. 4 uker. For å få dråper eller halsbånd må man kontakte veterinæren for å få en resept. ( Fra Nøtterøy dyreklinikk, [www.notteroy-dyreklinikk.no](http://www.notteroy-dyreklinikk.no))



Ekle små skapninger!



En flått pinsett er et godt redskap for å fjerne flåtten. Snurrer man den ut får man med alt dvs også munnen som har bitt seg fast. Ikke knus kroppen i prosessen, da kan smittestoff presses inn i bittstedet.